

Zastosowanie kombinacji analgetyków podawanych okołordzeniowo u chorej z uporczywymi bólami w przebiegu nowotworu trzustki z przerzutami.

Opis przypadku

Combined analgesic spinal therapy in patient with metastatic pancreatic carcinoma. Case report

Jan Jacek Rykowski

Department of Anaesthesia & Intensive Care Pain Management Unit, University Hospital Orebro, Sweden

Abstract: Intrathecal administration of analgesic agents has been giving promising results and became a standard practice in treating refractory cancer pain. However intraspinal morphine monotherapy in pain treatment may present some limitations because of undesirable side effects or tolerance and can restrict the effectiveness of the therapy. A combination therapy of agents acting on different pain pathways in a synergistic manner is desirable and efficacy of intrathecal use of opioids, α_2 -agonists and local anaesthetics in combined therapy in treating different pain conditions have been presented in many clinical reports. This case report describes pain therapy in refractory cancer pain in patient with pancreatic carcinoma with metastases using a combination of intrathecal drugs.

Key words: Combined intrathecal therapy; Pancreatic carcinoma; Refractory pain

Streszczenie: Okołodzeniowe (pp.) stosowanie środków analgetycznych w leczeniu przewlekłego bólu nowotworowego charakteryzuje się wysoką skutecznością i jest postępowaniem z wyboru w przypadku nieskuteczności standardowego leczenia. Stosowanie monoterapii morfiną w analgezji okołodzeniowej ma jednak swoje ograniczenia z powodu możliwości wystąpienia kłopotliwych objawów ubocznych jak i narastania tolerancji. Doniesienia kliniczne potwierdzają skuteczność stosowania kombinacji leków podawanych okołodzeniowo, działających synergistycznie poprzez różne mechanizmy na zasadzie nasilenia efektu analgetycznego. Opis przypadku przedstawia zastosowanie jednocześnie kilku środków podawanych okołodzeniowo u chorej w przebiegu nieoperacyjnego raka trzustki z przerzutami, z bólem o dużym nasileniu, opornym na konwencjonalne metody leczenia przeciwbólowego.

Słowa kluczowe: Łączona analgezja okołodzeniowa; Nowotwór trzustki; Terapia przeciwbólowa oporna na leczenie